


Clé ARCHI pour le châtaignier (*Castanea sativa*)




- Taillis - Futaies - Vergers -



Clé ARCHI pour le châtaignier (*Castanea sativa*)

- Taillis - Futaies - Vergers -

Typologie de la ramification



Flèche : partie du tronc située dans le houppier hors concurrence.

Houppier hors concurrence : partie du houppier excluant les zones inférieures ou latérales soumises à des phénomènes de concurrence.

Chicot : branche cassée de diamètre supérieur à 3 cm. Ne pas confondre « chicot » (plaie non recouverte par du bois) et « coude » (plaie recouverte).

U.A. : unité architecturale. La première est à l'origine du tronc, les suivantes dérivent les unes des autres par duplication et forment le houppier.

Ramification normale : ramification graduelle depuis l'axe principal jusqu'aux rameaux courts, ce qui se traduit par un contour quasi-pyramidal des systèmes ramifiés.

Ramification appauvrie : ramification incomplète (absence de rameaux courts ultimes) ou passage brutal de l'axe principal aux rameaux courts (sans rameaux intermédiaires) ou ramification quasi-inexistante, ce qui se traduit par des structures colonnaires ou filiformes. Ne pas confondre ramification appauvrie et densité de la ramification. Cette dernière est parfois faible en raison d'une croissance forte entraînant un espacement des zones ramifiées.

Ramification désorganisée : quand la croissance sympodiale du châtaignier est hiérarchisée, les modules s'empilent linéairement; dans le cas contraire, la hiérarchie disparaît donnant une ramification désorganisée.

Suppléant vigoureux : jeune suppléant non ramifié à forte croissance ou suppléant ramifié à ramification normale.

2^e houppier : structure constituée de suppléants (parfois mélangés à des branches) hiérarchisés entre eux, certains étant dominants, d'autres dominés.